



Saatavilla olevat koot

1,5 kg 5 kg

Indikaatiot

- Struviittivirtsakivien liuotus

Ei suositella käytettäväksi

- Kissanpennuille
- Tiineille tai imettäville narttukissoille
- Pitkäaikaiseen käyttöön ilman happo-emäs-tasapainon seurantaa (ruoan virtsaa happamoivan vaikutuksen vuoksi).
- Kissoille, joilla on muita kuin struviittivirtsakiviä.
- Kissoille, joilla on munuaissairaus tai metabolinen asidoosi.

Lisätietoja

- Älä anna virtsaa happamoivia aineita samanaikaisesti s/d™ Feline -ruoan kanssa.
- Tarkkaile virtsaa koko liuotuksen ajan ja hoida virtsatietulehdus tarvittaessa. Virtsan pH nousee, mikäli tulehduksen aiheuttavia ureaasia tuottavia mikrobeja ei hoideta. Liuotuksen toimimisen kannalta on tärkeää, että virtsan pH on hapan.
- Hill's s/d™ Feline -ruokaa syötetään aluksi 2-3 kuukautta. Tämän jälkeen struviittiin liittyvien FLUTD-oireiden uusimista voidaan ennaltaehkäistä Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline tai c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie tai Prescription Diet™ Metabolic + Urinary tai w/d™ Feline -ruoalla.
- Mikäli FLUTD-oireet uusivat Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline tai c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie tai Prescription Diet™ Metabolic + Urinary tai w/d™ Feline -ruokavaliion aikana; tutki virtsan pH, virtsatietulehduksen mahdollisuus ja uudelleenarvioi virtsakivien ja -kiteiden laatu.

Muita tuotteita, joita voidaan käyttää

- Onnistuneen struviittivirtsakivien liuotuksen jälkeen: Prescription Diet™ c/d™ Multicare tai c/d™ Stress Feline.
- Onnistuneen struviittivirtsakivien liuotuksen jälkeen ylipainoon taipuvaisilla kissoilla: Prescription Diet™ Metabolic + Urinary tai c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie tai w/d™ .
- Kalsiumoksalaattivirtsakivien ennaltaehkäisyyn: Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline tai c/d™ Stress Feline.
- Uraatti tai kystiiniivirtsakivien ennaltaehkäisyyn: Prescription Diet™ k/d™ Feline
- Jos kalsiumfosfaatti esiintyy brusiittina: Prescription Diet™ k/d™ Feline.

KESKEISET

OMINAISUUDET³

Keskeiset ominaisuudet	Arvo	Keskeiset hyödyt
Energia	Lisätty	Vähentää syötyä ruokamäärää ja siten myös mineraalien saantia.
Magnesium Fosfori	Vähennetty	Vähentää struviitin ainesosien (magnesium ja fosfaatti) pitoisuutta virtsassa.
Virtsan tavoite pH	Hapan: pH 5,9–6,1	Lisää struviitin liukoisuutta.
E-vitamiini Beetakaroteeni	Runsaasti	Neutraloi vapaita radikaaleja auttaen ennaltaehkäisemään virtsakiviä.
C-vitamiini	Ei lisätty	C-vitamiini on oksalaatin esiaste ja saattaa lisätä kalsiumoksalaatin muodostumisen riskiä struviittia liuottavan ruokavaliion aikana.

Koostumus, kuivaruoka (Chicken)

Kana (39%) ja kalkkunajauho, maissi, panimoriisi, eläinrasva, maissigluteenijauho, soijaöljy, kuivattu kananmuna, kivennäisaineet, lihaute, tauriini, vitamiinit, hivensaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).

FEEDING GUIDE

Paino kg kuivaruoka, grammaa

2	30 - 40
3	40 - 55
4	50 - 65
5	55 - 80
6	65 - 90
7 +	11 per kg

**Paino Säilyke Kuivaruoka,
kg 156 g grammaa**

2	1/2	10
3	1/2	20
4	1	10
5	1	20
6	1	30
7 +	1	6 per kg

RAVINTOAINEPITOISUUDET

	Ruussa	Kuiva-aineessa ⁴	per 100 kcal ME ⁵
Proteiini	31.80 %	34.38 %	7.63 g
Rasva	23.40 %	25.30 %	5.61 g
Hiilihydraatit (NFE)	30.60 %	33.08 %	7.34 g
Kuitu (raaka)	0.80 %	0.86 %	191.85 mg
Kosteus	7.50 %	-	1.80 g
Kalsium	0.86 %	0.93 %	206.24 mg
Fosfori	0.72 %	0.78 %	172.66 mg
Natrium	0.38 %	0.41 %	91.13 mg
Kalium	0.92 %	0.99 %	220.62 mg
Magnesium	0.06 %	0.06 %	14.39 mg
Kloridi	1.17 %	1.26 %	280.58 mg
Rikki	0.70 %	0.76 %	167.87 mg
Omega-3-rasvahapot	0.46 %	0.50 %	110.31 mg
Omega-6-rasvahapot	4.81 %	5.20 %	1.15 g
Tauriini	1,884 mg/kg	2,036.76 mg/kg	45.18 mg
A-vitamiini ¹⁰	6,043 IU/kg	6,532.97 IU/kg	144.92 IU
D-vitamiini ¹⁰	591 IU/kg	638.92 IU/kg	14.17 IU
E-vitamiini ¹⁰	550 mg/kg	594.59 mg/kg	13.19 mg
Betakaroteeni	1.50 mg/kg	1.62 mg/kg	0.04 mg

MUUNTOKELPOINEN ENERGIA

	Ruussa	Kuiva-aineessa ⁴
kcal/100 g	417	451
kJ/100 g	1,744	1,886
Virtsaa happamoivat aineet DL-metioniini 2.5g/kg		
Virtsan tavoite pH	5,9 - 6,1	